

## Diabète

Le diabète sucré du chien est une affection qui apparaît progressivement avec l'âge. Il s'agit donc d'un diabète sénile, dû à la diminution de la sécrétion de l'insuline par le pancréas.

Il est différent du diabète juvénile de l'être humain, qui est dû à la destruction massive des cellules qui produisent l'insuline et qui apparaît de ce fait précocement et brutalement.

L'embonpoint est la cause majeure du diabète chez le chien.

Symptômes : une augmentation de la consommation d'eau avec parallèlement une augmentation de la diurèse : le chien diabétique boit beaucoup et urine en abondance. Par la suite, d'autres symptômes peuvent apparaître, comme l'opacification du cristallin ou des troubles neurologiques en rapport avec l'accumulation de corps cétoniques dans l'organisme. Si aucun traitement n'est instauré, le chien dépérit ensuite assez rapidement.

Même si l'on ne peut pas le guérir, un diabète pris à son début peut se soigner (traitement médicamenteux régulièrement réadapté si besoin et régime alimentaire spécifique). Il est donc très important de le détecter précocement; le premier signe qui est l'augmentation de la consommation d'eau, doit être pris au sérieux et nécessite une consultation rapide chez votre vétérinaire.

Au niveau de la prévention, il est indispensable de veiller à ce que son chien "garde la ligne". On évitera de donner des gâteries en dehors du repas quotidien, surtout du sucre. ■

*Un Cocker anglais âgé de 10 ans n'est pas encore vraiment vieux, avec un bon accompagnement, il peut encore profiter longtemps de certaines activités comme les ballades avec ses maîtres.*




## Glandes anales : Inflammation

Les glandes anales sont en fait deux petites poches, situées sous la peau de part et d'autre de l'anus, qui contiennent des sécrétions utilisées par les ancêtres du chien pour marquer leur territoire.

Symptômes : Le signe le plus caractéristique de l'engorgement des glandes anales est ce qu'on appelle le signe «du traîneau»: le chien se frotte l'anus sur le sol en se traînant en position assise. Cela provoque des démangeaisons importantes au niveau de la région périanale, et entraîne un léchage frénétique et une irritation de l'anus (rougeurs, voire plaies dues au léchage).

Les causes de l'obstruction peuvent être multiples (tumeur, corps étranger, irritation) et, si le traitement (vidange des glandes + médicaments) ne donne pas de résultat probant, le vétérinaire devra procéder chirurgicalement à l'ablation des glandes, pour éviter les complications telles que abcès, fistule, ... la région péri-anale étant particulièrement difficile à traiter. Cette intervention, qui ne présente généralement pas d'inconvénient ultérieur pour la vie du chien, sera pratiquée sous anesthésie totale. ■



## Appareil cérébral : Le Syndrome Confusionnel du Vieux Chien

Il s'agit d'une affection comportementale du chien caractérisée par des troubles cognitifs. La cognition est la façon dont l'animal perçoit une information de son environnement grâce à ses sens, l'analyse, la retient et décide d'agir en conséquence.

Symptômes : Altération générale des acquis comportementaux : Discorde par rapport aux habitudes (refus de sortir, de rentrer, oubli des interdits, non-reconnaissance de personnes familières), malpropreté, activité désordonnée, confusion, hébétude, désorientation spatiale (non-reconnaissance des lieux familiers), désorientation temporelle avec troubles du sommeil (activités la nuit).

Des traitements existent, soit médicamenteux (antidépresseurs), soit comportementaux (exemples : établir un cadre stable, calme, rassurant pour l'animal, ne pas sanctionner les malpropretés et les déambulations). ■

### LE SAVIEZ-VOUS ?

***Si votre chien fait "le traîneau", avant toute autre chose, pensez à le vermifuger. En effet, dans la plupart des cas, une infestation par les vers est la cause de ce comportement***